



A. Les moyens possibles de transmission du virus VIH sont :

- |   |      |  |     |
|---|------|--|-----|
| 1. En partageant le même verre                          | 3,5% | 3. En s'asseyant sur des toilettes                 | 9%  |
| 2. <b>Pendant des rapports sexuels sans préservatif</b> | 76%  | 4. <b>Contact bouche - sexe (sans préservatif)</b> | 79% |

B. Pour se protéger contre le virus du SIDA, on peut utiliser:

- |                                   |      |                                  |      |
|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| 1. <b>Le préservatif masculin</b> | 83,5 | 3. La pilule                     | 4,5% |
| 2. Le stérilet                    | 2,5% | 4. <b>Le préservatif féminin</b> | 72%  |

C. Pour savoir si on a été contaminé par le virus VIH, il faut:

- |   |      |                               |     |
|---|------|-------------------------------|-----|
| 1. Faire une radio                      | 0,5% | 3. Faire une analyse d'urines | 25% |
| 2. <b>Aller faire une prise de sang</b> | 83%  |                               |     |

D. Si la réponse au test de dépistage du SIDA est : « séropositif », cela veut dire:

- |  |       |
|--|-------|
| 1. Tout va bien, la personne n'est pas touchée.              | 7,5%  |
| 2. <b>La personne a été contaminée par le virus du SIDA.</b> | 77,5% |

E. Le virus du SIDA installé dans l'organisme va s'attaquer :

- |   |     |
|---|-----|
| 1. Au foie et le détruire lentement                               | 11% |
| 2. <b>A certains globules blancs en affaiblissant l'organisme</b> | 73% |
| 3. Aux os en les rendant de plus en plus fragiles                 | 20% |

F. Après la contamination, la personne séro-positive :

- |  |       |
|--|-------|
| 1. A des signes de la maladie et elle peut transmettre cette maladie               | 48,5% |
| 2. <b>Elle n'a pas de signes de maladie mais elle peut transmettre la maladie.</b> | 61%   |

G. Le traitement contre le SIDA peut être prescrit :

- |   |     |
|---|-----|
| 1. <b>Entre 4 h et 48 heures après un rapport non protégé</b> | 33% |
| 2. <b>Chez une femme enceinte qui a le SIDA</b>               | 30% |
| 3. Après de nombreuses piqûres de moustiques.                 | 11% |

H. L'auto - test qui permet de dépister soi-même le SIDA chez soi :

- |   |     |
|---|-----|
| 1. <b>N'est pas remboursé par la sécurité sociale</b>                               | 22% |
| 2. <b>Donne un résultat certain suite à un risque pris au moins 3 mois plus tôt</b> | 33% |
| 3. Donne un résultat certain suite à un risque pris au moins 1 mois plus tôt        | 17% |

**Bravo à la classe de Tle Pro L qui a le plus de bonnes réponses au questionnaire.**

**Les questions F, G et H ont les moins bons scores, donc à revoir .**

**A l'année prochaine pour faire encore mieux !**